

neo Borocillina

1,2 mg + 20 mg pastiglie
2,4 diclorobenzil alcool, sodio benzoato

16 PASTIGLIE

Una pastiglia contiene 1,2 mg di 2,4-diclorobenzil alcool e 20 mg di sodio benzoato (pari a 17 mg di acido benzoico).

Contiene magnesio stearato, silice precipitata, mentolo, menta essenza, eucaliptolo, citrale, saccarosio. Per ulteriori informazioni leggere il foglio illustrativo.

Leggere il foglio illustrativo prima dell'uso.

Uso orale

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Conservare a temperatura non superiore a 30° C.

Titolare A.I.C.: Alfasigma S.p.A. – Viale Sarca, n. 223

20126 Milano (MI)

A.I.C.: 022632121

Medicinale di automedicazione



Neo Borocillina pastiglie ha un'azione disinfettante e antibatterica nei confronti di numerosi germi che possono provocare malattie del cavo orale, ha un'azione battericida rapida (elimina i batteri) ed ha un effetto prolungato.

Una pastiglia da sciogliere lentamente in bocca ogni 2-3 ore fino ad un massimo giornaliero di 8 pastiglie.

Non superi le dosi consigliate.

neo Borocillina

1,2 mg + 20 mg pastiglie

2,4 diclorobenzil alcool e sodio benzoato

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo 7 giorni.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è Neo Borocillina pastiglie e a che cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare Neo Borocillina pastiglie
3. Come usare Neo Borocillina pastiglie
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Neo Borocillina pastiglie
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è Neo Borocillina pastiglie e a cosa serve

Neo Borocillina pastiglie contiene i principi attivi 2,4 diclorobenzil alcool e sodio benzoato ed appartiene ad una categoria di farmaci detti antisettici (antibatterici) del cavo orofaringeo (bocca e gola), utilizzati per la cura dei sintomi delle malattie infiammatorie della bocca e della gola.

Il 2,4 diclorobenzil alcool e il sodio benzoato svolgono un'azione antisettica (antibatterica) locale del cavo orale. Inoltre il sodio benzoato contribuisce a rendere più fluide le secrezioni (catarro) delle vie respiratorie.

Neo Borocillina pastiglie:

- ha un'azione disinfettante e antibatterica nei confronti di numerosi germi che possono provocare malattie del cavo orale
- ha un'azione battericida rapida (elimina i batteri) ed ha un effetto prolungato

2. Cosa deve sapere prima di usare Neo Borocillina pastiglie

NON usi Neo Borocillina pastiglie

- se è allergico al 2,4 diclorobenzil alcool o al sodio benzoato o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6)
- nei bambini di età inferiore ai due anni con predisposizione al laringospasmo (contrazione dei muscoli della laringe) e alle convulsioni

Avvertenze e precauzioni

L'impiego, specie se prolungato, dei prodotti per uso locale può dare origine a fenomeni di allergia. In tal caso interrompa il trattamento e consulti il medico.

Bambini

Neo Borocillina pastiglie non deve essere usata in bambini di età inferiore ai due anni con predisposizione alle convulsioni e al laringospasmo (contrazione dei muscoli della laringe), perché contiene mentolo.

Nei bambini di età superiore ai due anni usi questo medicinale con precauzione e sotto il diretto controllo del medico.

Altri medicinali e Neo Borocillina pastiglie

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale. Eviti di assumere altri medicinali disinfettanti della bocca e della gola insieme a Neo Borocillina pastiglie.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

In gravidanza e durante l'allattamento, Neo Borocillina pastiglie deve essere usata solo in caso di effettiva necessità e sotto il diretto controllo del medico, perché non esistono dati attendibili sull'uso di 2,4 diclorobenzil alcool e sodio benzoato durante la gravidanza e l'allattamento.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare un veicolo e sull'uso di macchinari.

Neo Borocillina pastiglie contiene saccarosio

Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale. Questo medicinale contiene 0.9 g di saccarosio per dose: da tenere in considerazione in persone affette da diabete mellito.

3. Come usare Neo Borocillina pastiglie

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata è:

una pastiglia da sciogliere lentamente in bocca ogni 2-3 ore fino ad un massimo giornaliero di 8 pastiglie.

Non superi le dosi indicate.

Le pastiglie vanno sciolte lentamente in bocca per mantenere il più a lungo possibile la mucosa del cavo orofaringeo sotto l'azione del medicinale.

Consulti il medico se non nota risultati apprezzabili dopo breve periodo di trattamento (non superiore ai 7 giorni).

Se usa più Neo Borocillina pastiglie di quanto deve

Avverta immediatamente il medico o si rivolga all'ospedale più vicino in caso di ingestione accidentale di una dose superiore a quella raccomandata per l'assunzione giornaliera di questo medicinale.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Effetti indesiderati molto rari:

- reazioni allergiche (ipersensibilità),
- sensazione di giramento di testa,
- difficoltà a respirare (insufficienza respiratoria),
- gonfiore alla gola (edema alla glottide),
- vomito,
- malessere,
- sudorazione,

- gonfiore (edema) delle braccia,
- gonfiore della bocca, delle palpebre, del volto
- orticaria,
- danneggiamento dei globuli rossi e conseguente anemia (anemia emolitica),
- colorazione gialla della pelle e degli occhi (ittero).

Il sodio benzoato può avere un'azione blandamente irritante sulla pelle e sulle mucose.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili.

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Neo Borocillina pastiglie

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione.

La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Conservare a temperatura non superiore ai 30°C.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

È importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservi sia la scatola che il foglio illustrativo.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Neo Borocillina pastiglie

- I principi attivi sono 2,4 diclorobenzil alcool e sodio benzoato. Una pastiglia contiene 1,2 mg di 2,4 diclorobenzil alcool e 20 mg (equivalente a 17 mg di acido benzoico) di sodio benzoato.
- Gli altri componenti sono magnesio stearato, silice precipitata, mentolo, menta essenza, eucaliptolo, citrale, saccarosio (vedere paragrafo 2 "Neo Borocillina pastiglie contiene saccarosio").

Descrizione dell'aspetto di Neo Borocillina pastiglie e contenuto della confezione

Neo Borocillina pastiglie si presenta in forma di pastiglie.

Il contenuto della confezione è di 16, 18, 20 pastiglie. È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:
Alfasigma S.p.A. – Viale Sarca, n. 223 – 20126 Milano (MI)

Produttore:
Alfasigma S.p.A. – Via E. Fermi, n. 1 – 65020 Alanno (PE)

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il

Agosto 2017